

Số: /TB - UBND

Lục Bình, ngày tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO
Tình hình sâu, bệnh hại lúa mùa

Căn cứ Thông báo số 11/ TB–TTDVNN ngày 04/8/2023 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bạch Thông về việc thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa mùa và kết quả kiểm tra tình hình thực tế trên địa bàn xã. Hiện nay cây lúa vụ mùa trên địa bàn xã đang trong giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ (*mật độ phổ biến 2-3 con/m², cá biệt 6-8 con/m²*), Bọ rầy, Bệnh đạo ôn lá, sâu đục thân gây hại rải rác. Để chủ động trong công tác phòng trừ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh hại gây ra, Ủy ban nhân dân xã Lục Bình đề nghị các ông, bà Trưởng thôn thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo tình hình sâu, bệnh hại lúa (*đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bọ rầy, sâu đục thân*) đến các hộ dân trong thôn và đôn đốc các hộ dân thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, phát hiện sâu, bệnh hại sớm để phun trừ kịp thời.

- Các biện pháp phòng trừ:

+ **Sâu cuốn lá nhỏ:** Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, bảo vệ thiên địch. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng khi thấy mật độ sâu cao từ 20 con/m² trở lên tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc như: Vi-BT, Bitadin WP, Regent 800WP, Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC.

+ **Đối với bọ rầy:** Khi thấy mật độ rầy khoảng 20 con/khóm hoặc 3 con/dảnh trở lên tiến hành phun trừ, sử dụng 1 số loại thuốc nội hấp như: Sachray 200WP, Gà nòi 95SP, Actara 25WG, Tre bon 10EC, Oshin 20WP. khi phun thuốc hạ thấp vòi phun để trừ rầy tập trung dưới bẹ và gốc lúa.

Chú ý: Giữ nước trong ruộng từ 3-5 cm. Những ruộng có mật độ rầy cao phải phun kếp 2-3 lần, mỗi lần cách nhau từ 5-7 ngày. Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy.

+ **Bệnh đạo ôn:** Khi thấy ruộng lúa xuất hiện bệnh thì dùng bón phân đạm, không phun phân bón lá; giữ nước trong ruộng 3 - 4 cm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ bệnh đạo ôn bằng một trong các loại thuốc như: Filia® 525SE, Trizole 400SC/75WG, Beam 75WP, Fuji-one 40EC,... đối với những diện tích bị hại nặng thì phun kếp 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 - 7 ngày. Nên phun thuốc vào buổi sáng khi trời khô sương hay vào chiều mát, không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt; những ruộng phun xong gặp mưa phải phun lại.

+ **Sâu đục thân:** Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng trừ như: Ngắt bỏ ổ trứng, đánh héo đem tiêu huỷ. Khi thấy mật độ cao thì sử dụng một trong những loại thuốc sau để phun: Voliam Targo 063SC, Patox 95SP, Gà nòi 95SP, Regent 800WP,...

Chú ý: Phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá, bông và tuần thủ theo kỹ thuật “4 đúng” khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- **Dự báo:** Trong thời gian tới, với giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa ẩm sẽ là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu, bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, bọ rầy, sâu đục thân và bệnh đạo ôn.

- **Giao Công chức ĐC-NN-XD&MT xã:** Thường xuyên theo dõi tình hình sâu, bệnh hại, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- **Người làm công tác Đài truyền thanh xã:** Tăng thời lượng phát sóng các thông tin về tình hình sâu, bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ để người dân biết và thực hiện.

Với nội dung trên Ủy ban nhân dân xã Lục Bình đề nghị các ông, bà Trưởng thôn quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã;
- Trang TTĐT xã;
- Chủ tịch, PCTUBND xã;
- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã;
- Người làm công tác Đài truyền thanh xã;

Gửi bản giấy:

- Các ông, bà Trưởng thôn;
- Lưu: VP UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hậu