

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỤC BÌNH**

Số: /UBND - NL

V/v tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại cây
trồng vụ mùa năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lục Bình, ngày tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Các ông(bà) Trưởng thôn

Thực hiện văn bản số 89/ UBND - NN& PTNT ngày 05/9/2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa năm 2023. Theo đó, hiện nay lúa mùa chính vụ đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng, lúa mùa sớm đang giai đoạn ôm đòng - trở bông; trên cây lúa xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: Bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn... Với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa, cùng với diễn biến thời tiết trong thời gian tới được dự báo sẽ thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh, phát triển và lan trên diện rộng. Đặc biệt, thời gian tới trùng với dịp nghỉ lễ 02/9, nếu không chủ động phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh tiếp tục phát triển, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn triển khai ngay một số nội dung như sau:

Chỉ đạo bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng chống kịp thời một số sinh vật gây hại chính trên lúa, cụ thể:

- Bọ rầy: Phát hiện chính xác các đợt rầy, chỉ đạo phun trừ kịp thời khi rầy tuổi nhỏ. Chú ý diện tích lúa nếp, lúa lai; diện tích cấy dày, cấy nhiều dảnh, bón phân không cân đối, diện tích nhiễm rầy nặng của năm trước.

+ Phun trừ khi mật độ rầy khoảng 20 con/khóm hoặc 3 con/dảnh bằng một trong các loại thuốc như: Chế phẩm sinh học nấm xanh Metarhizium, TASIEU 1.9EC, Sachray 200WP, Patox 95SP, Gà nòi 95SP, Oshin 20WP ... Khi phun giữ nước trong ruộng từ 3-5 cm. Ruộng có mật độ rầy cao phải phun kép 2 lần, cách nhau từ 5→7 ngày. Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh tính kháng thuốc của rầy. Khi phun phải rẽ hàng lúa tạo thành băng, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy tập trung dưới bẹ và gốc lúa. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau phòng trừ rầy và tiếp tục theo dõi, tránh hiện tượng rầy bùng phát trở lại.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Phát hiện sớm và phun trừ khi sâu tuổi nhỏ để bảo vệ lá đòng. Khi mật độ sâu > 10 con/m² phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Bitadin WP, TASIEU 1.9EC, Patox 95SP, Gà nòi 95SP, Voliam Targo 063SC ...

- Bệnh đạo ôn lá: Theo dõi sát diễn biến của thời tiết để chủ động phòng trừ, đặc biệt tại những vùng có nguy cơ cao (diện tích cấy giống nếp, giống nhiễm, diện tích trồng trong khe, diện tích thường xuyên bị nhiễm bệnh trong

những vụ trước, năm trước...). Khi lúa bị bệnh đạo ôn gây hại, phun trừ sớm bằng một trong các loại thuốc như: Ketomium, Folia® 525SE, Trizole 400SC/75WG, Fuji-one 40EC, Fuan 40EC... Nếu bệnh phát triển mạnh thì phun lại sau 5 - 7 ngày. Diện tích bị bệnh đạo ôn lá, cần chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông.

- Bệnh khô vằn: Bệnh thường phát sinh trên diện tích lúa nếp, lúa lai; cây dầy, bón phân không cân đối. Bệnh hại nặng giai đoạn làm đòng, trổ bông làm hạt bị lép, lửng, giảm năng suất. Ruộng bị bệnh thu gom lá già, lá bị bệnh tiêu hủy, sau đó phun trừ bằng một trong những loại thuốc như: Anvil 5SC, Amistar top 325SC, Validacin 5L... Khi phun phải rẽ hàng lúa tạo thành băng, hạ thấp vòi phun để thuốc tiếp xúc trực tiếp với vết bệnh.

Chú ý: sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định với vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng.

Với nội dung trên, đề nghị các thôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Trang TTĐT xã.

Gửi bản giấy:

- Các ông (bà) trưởng thôn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Văn Luân