

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ LỤC BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NL

Lục Bình, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chủ động phòng trừ sâu bệnh hại  
trên một số cây trồng vụ xuân 2024

Kính gửi: Các ông( bà) Trưởng thôn

Thực hiện công văn số 689/UBND- NN&PTNT ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên một số cây trồng vụ xuân 2024. Theo đó, hiện nay trên một số cây trồng xuất hiện sâu bệnh hại như: Sâu xám, sâu keo mùa thu hại ngô; sâu ong hại mướp; bệnh sương mai, thối thân, héo xanh vi khuẩn hại cây bí xanh; bệnh thán thư hại cây hồi... Thời tiết tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới được dự báo có diễn biến bất thường, từ tháng 4 - 6 năm 2024 nhiệt độ trung bình trên toàn tỉnh phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu, bệnh phát sinh và gây hại trên các cây trồng như: Bọ rầy, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại cây lúa; sâu keo mùa thu, sâu gai hại cây ngô.

Để chủ động trong công tác phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất vụ xuân năm 2024, UBND xã đề nghị các thôn triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

Chỉ đạo các hộ dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời một số sinh vật gây hại chính, cụ thể:

**\* Trên cây lúa**

- **Bọ rầy:** Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện các đợt rầy, phun trừ kịp thời khi rầy tuổi nhỏ (tuổi 1, 2). Chú ý, các lúa rầy:

+ Lúa 2: Rầy cám nở rộ từ giữa đến cuối tháng 4, hại trên diện rộng giai đoạn cuối đẻ nhánh - ôm đòng.

+ Lúa 3: Rầy cám nở rộ từ giữa đến cuối tháng 5. Do xen gối rầy lúa 2 nên mật độ tăng cao; nếu không chủ động phòng trừ sẽ gây “cháy rầy” vào cuối tháng 5 - đầu tháng 6.

- **Sâu đục thân:** Thường xuyên kiểm tra, theo dõi những diện tích lúa cấy sớm, diện tích ruộng trong khe và những khu đồng thường xuyên bị sâu đục thân gây hại từ các vụ trước. Chú ý lúa 2, trưởng thành ra rộ từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 gây ung đòng, bông bạc giai đoạn lúa ôm đòng đến trổ. Tăng cường kiểm tra, ngắt ổ trứng, nhổ bỏ đánh héo, bông bạc mang ra khỏi ruộng để tiêu hủy, phun trừ khi sâu tuổi nhỏ bằng một trong các loại thuốc như: Voliam Targo 063SC, Dupont Prevathon 5SC, Virtako 40WG... để phun trừ khi sâu non tuổi nhỏ.

- **Bệnh đạo ôn lá:** Theo dõi sát diễn biến của thời tiết để hướng dẫn và chỉ đạo phòng trừ, đặc biệt tại những vùng có nguy cơ cao (diện tích cấy giống nhiễm, diện tích trồng trong khe, diện tích thường xuyên bị nhiễm bệnh trong những vụ trước, năm trước...). Khi lúa bị bệnh đạo ôn gây hại, cần phun trừ sớm bằng một trong các loại thuốc như: Folia® 525SE, Trizole 400SC/75WG, Fuji-

one 40EC... nếu bệnh phát triển mạnh thì có thể phun lại sau 5 - 7 ngày. Những diện tích bị bệnh đạo ôn lá gây hại, cần chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bằng các loại thuốc đặc hiệu ngay khi lúa bắt đầu trổ và sau khi đã trổ thoát.

- **Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:** Bệnh phát sinh gây hại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 khi có những đợt mưa dông đầu mùa. Thường ở những chân ruộng bị mưa lũ tràn qua và cây các giống có bản lá to, màu xanh đậm; bệnh hại nặng những ruộng thường xuyên bị bệnh ở những vụ trước, ruộng bón nhiều đạm, bón đạm muộn và bón phân không cân đối. Khi lúa bị bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại, cần phun trừ sớm bằng một trong các loại thuốc như: Totan 200WP, Xanthomix 20WP, PN - Balacide 32WP, Starner 20WP, Linacin 40SL... pha và phun theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

\* **Trên cây ngô:** Sâu xám, sâu keo mùa thu, gây hại rải rác, mật độ phổ biến thấp; bệnh sương mai, bệnh huyết dụ gây hại cục bộ.

#### **Biện pháp phòng trừ:**

- Sâu xám: Giai đoạn sâu non, bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hay chiều tối bằng cách bới đất quanh gốc cây bị sâu cắn để bắt sâu. Xới đất, rắc vôi bột hoặc nấm xanh Metarhizium, chế phẩm Bacillus khu vực sâu gây hại.

- Sâu keo mùa thu: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời. Bắt sâu bằng tay, ngắt bỏ ổ trứng đưa ra khỏi ruộng để tiêu hủy, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG, Karuba WP, Bitadin WP.... để phun trừ; phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá và nách lá.

- Bệnh sương mai: Khi cây chớm biểu hiện bệnh như ngọn hơi chùn lại thì phun một trong các loại thuốc Ridomil Gold 68WG, Amistar Top 325SC. Nếu cây đã bị xoắn đọt và nghiêng về một phía thì nhổ bỏ và tiêu hủy để giảm sự lây lan của nguồn bệnh.

- Bệnh huyết dụ: Chăm sóc, tưới nước, xới xáo đất xung quanh gốc, bón bổ sung các loại phân qua lá, phân bón rễ có chứa lân và các nguyên tố trung, vi lượng.

- Chỉ đạo nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học; đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng an toàn, đúng quy định.

Với nội dung trên, UBND xã Lục Bình đề nghị các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- MTTQ và các ban ngành đoàn thể
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;

*Gửi bản giấy:*

- Các ông(bà) trưởng thôn;
- Lưu: VP UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hứa Văn Luân**

